OCT 3 0 1929

EN VENTE CHEZ L'AUTEUR

(Prix du présent fascicule : 2 fr. 50)

72,896

MÉLANGES EXOTICO-ENTOMOLOGIQUES

SEIZIÈME FASCICULE

(20 octobre 1915)

PAR

MAURICE PIC

OFFICIER D'INSTRUCTION PUBLIQUE
CHEVALIER DU MÉRITE AGRICOLE
DIRECTEUR DE L'« ÉCHANGE »
CORRESPONDANT DU MUSÉUM DE PARIS
MEMBRE DE NOMBREUSES SOCIÉTÉS SCIENTIFIQUES
DE FRANCE ET DE L'ÉTRANGER

MOULINS

IMPRIMERIE ÉTIENNE AUCLAIRE

ANCIENNE MAISON C. DESROSIERS

1915

Tous droits réservés

LIBRARY
MUS. COMP. ZOOLOGY
CAMBRIDGE, MASS.

INTRODUCTION

Le présent fascicule renferme deux articles. Dans le premier sont décrits plusieurs nouveaux genres et un certain nombre d'espèces ou de variétés appartenant à diverses familles dont plusieurs Hétéromères.

Le second est limité à la vaste famille des Hétéromères et traite de diverses sous-familles du groupe. Les espèces et variétés nouvelles qu'il contient sont présentées sous forme de diagnoses (j'ose espérer que celles-ci ne paraîtront pas trop courtes) destinées à assurer mes droits d'auteur-descripteur. S'il est nécessaire, je publierai ultérieurement des notes supplémentaires sur certaines de ces nouveautés.

Genres nouveaux, Espèces et Variétés nouvelles

Scaphidium atricolor n. sp. Nitidus, postice valde attenuatus, ater, antennis ad basin rufis, tarsis pro parte brunnescentibus.

Brillant, très atténué en arrière, entièrement noir avec la base des antennes rousse et les tarses en partie rembrunis. Yeux rapprochés ; prothorax long, très rétréci en avant, fortement et éparsément ponctué avec, sur la base, une rangée arquée de points forts ; élytres très atténués postérieurement, à ligne basale de points médiocres et des rangées raccourcies de points forts sur le disque, strie suturale assez enfoncée ; pattes longues, tibias un peu arqués. Long. 6 mill. Kina-Balu, au nord de Bornéo.

Peut se placer près de *S. atrum* Matth., mais plus rétréci en arrière et ligne de points de la base du prothorax plus forte.

Scaphidium malaccanum n. sp. Nitidus, subovatus, niger, capite antice antennisque ad basin rufis, tarsis brunnescentibus.

Brillant, subovalaire, noir avec le devant de la tête et les antennes, moins leur massue, roux. Yeux éloignés ; prothorax long, très rétréci en avant, médiocrement ponctué avec, sur la base, une rangée arquée de points moyens ; élytres un peu arqués sur les côtés, à ligne basale de points assez gros et ponctuation plus ou moins forte, irrégulière et espacée, strie suturale un peu enfoncée ; pattes assez longues, foncées, tarses brunâtres. Long. 5 mill. Malacca.

Forme plus trapue, moins atténuée en arrière que le précédent avec la ponctuation différente sur les élytres et devant de la tête, en outre, roux.

Scaphidium vicinum n. sp. Nitidus, satis elongatus, rufus, infra corpore pro parte, clava antennarum pedibusque nigris, tarsis rufescentibus.

Brillant, assez allongé, éparsément ponctué, roux avec une partie du dessous du corps, la massue des antennes et les pattes noires, ces dernières avec les tarses roussâtres. Yeux assez rapprochés ; prothorax long, très rétréci en avant, avec, sur la base, une rangée arquée de points assez gros ; élytres un peu atténués en arrière, à ligne basale de points assez gros, strie suturale fine ; poitrine et parties avoisinantes rousses, abdomen foncé avec l'extrémité et le pygidium roux ; pattes assez longues. Long. 6 mill. Formose : Fainan.

Voisin de *S. ruficolor* Pic, dessous en partie roux et ponctuation du dessus plus distincte.

Scaphidium grande v. nov. subannulatum. Niger, femoribus ad medium parum distincte rufescentibus, scutello satis magno. Bornéo : Pontianak.

Diffère de *S. grande* Gestro, au moins par la coloration des cuisses qui paraissent foncées, l'écusson semble aussi plus large que d'ordinaire et les élytres sont un peu plus creusés vers la suture.

Scaphidium celebense n. sp. Nitidus, satis elongatus, niger , capite antice, antennis ad basin thoraceque lateraliter rufis, elytris ad basin et apice rufo fasciatis, pedibus pro parte brunnescentibus.

Brillant, finement et éparsément ponctué, assez allongé, noir, devant de la tête, base des antennes et côtés antérieurs du prothorax roux, élytres ornés, près de la base, d'une bande ondulée, celle-ci isolée des bords, et au sommet d'une bande droite, les deux rousses. Yeux rapprochés ; prothorax long, très rétréci en avant avec, sur la base, une rangée arquée de points forts ; élytres un peu arqués sur les côtés, assez rétrécis postérieurement, à ligne basale de points moyens, strie suturale un peu enfoncée ; pattes moyennes, en partie rembrunies sur les cuisses et les tarses. Long. 5 mill. Célèbes : Tjamba.

Paraît voisin de *S. orbiculosum* Reitt. (ex description), il en différerait au moins par le prothorax maculé de

roux sur les côtés et les dessins fasciés (et non maculés) des élytres.

Scaphidium gibbosum n. sp. Nitidus, subovatus, rufescens, pro parte brunnescens, elytris parum distincte flavo bifasciatis et ad suturam flavo lineatis, clava antennarum nigra.

Brillant, subovalaire, indistinctement ou très finement ponctué sur l'avant-corps, roussâtre, rembruni par places, élytres ornés de deux fascies transversales droites flaves, peu distinctes, avec une bande longitudinale présuturale de même coloration. Yeux rapprochés ; massue des antennes noire ; prothorax pas très long, rétréci en avant, un peu gibbeux sur son milieu postérieur, à strie basale arquée, ponctuée de petits points peu distincts ; élytres arqués sur les côtés, un peu rétrécis vers le sommet, ayant, sur le milieu du disque, des rangées raccourcies et irrégulières de points plus ou moins forts, strie suturale bien marquée ainsi que la rangée basale ponctuée ; pattes longues. Long. 4 mill. environ. Bornéo : Martapoera (Doherty).

Voisin de *S. borneense* Pic, élytres non concolores et diversement ponctués, prothorax surélevé sur son milieu postérieur.

Scaphidium Waterstradti n. sp. Nitidus, subovatus, rufo-testaceus, clava antennarum nigra.

Brillant, subovalaire, roux-testacé avec seulement la massue des antennes foncée, indistinctement ponctué sur l'avant-corps. Yeux rapprochés ; prothorax assez court, très rétréci en avant, à strie basale arquée ponctuée de points fins mais distincts ; élytres courts, subarqués, nettement rétrécis postérieurement, ayant, sur le milieu du disque, des rangées raccourcies de gros points, à ligne basale de points moyens, strie suturale un peu enfoncée ; pattes longues. Long. 4 mill. environ. Ile Banguey (Waterstradt).

Diffère du précédent par la coloration uniforme, le prothorax non surélevé sur le milieu de sa base, etc.

Toxidium chilense n. sp. Elongatus, convexus, nitidus, niger, antennis ad basin, pedibus, pygidio, thorace ad basin elytrisque apice testaceis aut rufescentibus.

Allongé, convexe, brillant, indistinctement ponctué, noir, base des antennes, pattes, pygidium, extrême sommet des élytres, une bordure postérieure au prothorax testacés ou roussâtres. Prothorax court, rétréci en avant, à lobe médian subtriangulaire ; élytres rétrécis postérieurement, un peu comprimés sur les côtés, à strie suturale fine, n'atteignant pas la base ; pattes moyennes, testacées ou roussâtres avec les cuisses un peu rembrunies. Long. 1,5 mill. Chili : Valdivia.

Peut se placer près de *T. gammaroides* Lec. mais pygidium testacé, et prothorax à base plus claire.

Pseudoscaphosoma ruficolle n. sp. Ovatus, nitidus, rufus, elytris nigris, apice rufo marginatis, infra corpore pro parte brunnescente.

Ovalaire, brillant, médiocrement et éparsément ponctué sur les élytres, roux avec les élytres noirs à sommet roux, milieu du dessous du corps rembruni. Prothorax assez court, rétréci en avant, à lobe médian arqué ; écusson très petit ; élytres peu rétrécis postérieurement, à strie suturale forte, double et s'écartant en avant sans reborder la base ; pattes moyennes. Long. 2 mill. Ile Banguey.

Très distinct de *P. niasense* Pic par la forme moins trapue et la coloration.

Scaphosoma luteomaculatum n. sp. Subovatus, nitidus, niger, capite antice, pygidio, antennis pedibusque pro majore parte testaceis, elytris nigris, prope basin et apice luteo maculatis.

Subovalaire, brillant, finement et éparsément ponctué sur le prothorax, médiocrement et irrégulièrement sur les élytres, noir avec le devant de la tête, le pygidium et les membres testacés, cuisses un peu rembrunies, élytres noirs, ornés, sur chacun, de 2 macules d'un testacé jaunâtre, l'une près de la base, subarrondie et discale,

l'autre apicale, assez large, strie des élytres bien marquée, atteignant la base mais sans se recourber en avant. Long. 1,5 mill. Java.

Cette jolie petite espèce, très distincte par ses macules élytrales claires, peut se placer près de *S. balteatum* Matth.

Lycoprogentes nov. gen. Antennis crassis, articulis 2° et 3° brevis, articulo ultimo appendiculato ; thorace transverso, 5 areolato, areola mediana postice distincta, antice aperta ; elytris elongatis, multi et parum costulatis, intervallis punctato quadratis.

Ce nouveau genre, intermédiaire entre *Dictyopterus* Latr. et *Taphes* Wat., est bien caractérisé par sa structure antennaire et par la forme de l'aréole médiane de son prothorax qui est très nette en arrière mais peu distincte en avant.

Lycopogentes Pouilloni n. sp. Elongatus, subparallelus, fere opacus, niger, capite, thorace, scutello elytrisque ochraceo-purpureis, antennis apice testaceis et attenuatis, elytris thorace parum, latioribus, 9 aut 10 costulatis. Indes : Djarjeeling (ex Pouillon).

Pristolycus Laboisierei n. sp. Satis elongatus, niger, thorace testaceo, in disco postice nigro maculato ; elytris testaceis, antice ad suturam nigro notatis. Long. 7 mill., Tonkin. Don de mon aimable collègue Laboissière à qui je suis heureux de dédier cette nouveauté.

Cette espèce est très distincte de *P. sagulatus* Gorh., par la forme plus allongée du corps et le prothorax testacé à macule médiane noire.

Pristolycus sagulatus v. nov. diversecostatus. Elytris testaceis, antice breve nigro notatis, costis discoidalibus testaceis. Long. 8 mill. Chine.

Diffère, à première vue, de la forme type par les côtes discales non foncées.

Ichthyurus bilineatus n. sp. ♀ Elongatus, subni-

tidus, pro parte niger, pro parte luteo-testaceus, supra testaceus, capite postice, thorace elytrisque lateraliter nigro-lineatis.

Allongé, peu brillant, en partie noir, en partie testacé-jaunâtre, antennes foncées à base testacée, pattes en majeure partie testacées, dessus testacé à bandes longitudinales : deux sur la tête derrière les yeux et de chaque côté, près du bord latéral du prothorax puis sur les côtés des élytres (ces derniers sont jaunâtres au sommet et sur leur partie interne) ; dessous du corps testacé, milieu de l'abdomen noir, dernier segment noir sur les côtés, testacé au milieu, échancré en arc, à dents robustes et pas très longues ; pattes grêles. Long. 9 mill. Formose.

Cette espèce, facile à reconnaître par les bandes noires longitudinales de son prothorax, peut se placer près de *I. nigripennis* Pic.

Camariomorpha nov. gen. *Camaria* Serv. vicinus sed angulis anticis thoracis latis, elytris apice impressis et humeris prominulis facile distinguendus.

Le caractère tiré des angles antérieurs du prothorax large et plus ou moins saillant, joint aux épaules saillantes et aux élytres irrégulières et munis de plaques brillantes vers leur extrêmité distinguera ce nouveau genre du genre *Camaria* Serv.

Camariamorpha singularis n. sp. Modice elongatus, postice attenuatus, æneus, apice pro parte rufescens ; antennis nigris ; thorace transverso, mediocre sat sparse punctato ; elytris mediocre striato-punctatis, apice irregulariter impressis. Long. 2,3-2,5 mill. Java.

Spinamarygmus nov. gen. Corpus oblongo-ovatus ; oculis satis distentibus ; clypeo subarcuato ; femoribus anticis valde dentatis, tibiis ♂ valde curvatis et intus emarginatis, ♀ subarcuatis.

Ce nouveau genre, voisin de *Amarygmus* Dalm., se distingue, à première vue, par ses fémurs dentés ;

diffère, en outre, de *Coriogetum* Pascoe par le prothorax plus transversal, mais étroit par rapport aux élytres et la structure des tibias antérieurs du ♂.

Spinamarygmus indicus n. sp. Oblongus, parum convexus, nitidus, nigro-aeneus, antennis pedibusque rufescentibus.

Oblong, peu convexe, brillant, noir bronzé, antennes et pattes roussâtres. Tête densément et ruguleusement ponctuée ; antennes longues et grêles ; prothorax transversal, subarqué sur les côtés, à ponctuation assez fine et écartée ; élytres un peu plus larges que le prothorax, à épaules marquées mais arrondies, atténués à l'extrémité, finement strié-ponctués, intervalles larges, à ponctuation plus ou moins fine et écartée ; pattes assez longues, cuisses un peu épaissies, les antérieures dentées, tibias antérieurs chez ♂ très courbés et un peu coudés, échancrés en dedans vers le milieu. Long. 8-9 mill. Indes.

Microamarygmus nov. gen. Corpus subovatus, convexus ; oculis mediocris, valde distantibus ; antennis elongatis, satis validis, articulo 2° breve, 3° parum elongato, 4° longiore ; sutura clypealis indistincta ; pedibus satis validis.

Diffère, à première vue de *Amargymus* Dalm. par ses yeux plus petits, éloignés, non enchassés dans le prothorax et la structure plus robuste des antennes.

Microamarygmus madurensis n. sp. Minutus, convexus, nitidus, supra niger, scutello, aliquot limbo elytrorum, infra corpore antennis ad basin pedibusque rufescentibus. Long. 4 mill. Indes : Madura.

La ponctuation de cette petite espèce est nette, plus rapprochée et plus forte sur la tête que sur le prothorax, les élytres ont des rangées de points avec les intervalles ponctués de points irréguliers, aussi forts ou plus fins.

Pubamarygmus nov. gen. Corpus pubescens, elongatus, postice attenuatus ; oculis approximatis ;

antennis elongatis, articulis 3° mediocre ; sutura clypealis parum indicata, et abbreviata ; pedibus mediocris ; prosterno lato, postice angulato, mesosterno antice excavato.

Ce nouveau genre est facilement distinct de *Amarygmus* Dalm. par sa forme plus allongée et son corps pubescent.

Pubamarygmus viridipennis n. sp. Parum latus, nitidus, nigro-piceus, antennis pedibusque pro parte rufescentibus, elytris viridi-metallicis. Long. 12 mill. Nouvelle Guinée : Andai.

Chez cette espèce, qui est ornée de poils d'un gris jaunâtre longs et irrégulièrement disposés, la ponctuation de l'avant-corps est irrégulière et plus ou moins écartée, les élytres sont faiblement striés postérieurement, finement et irrégulièrement ponctués.

Pubamarygmus major n. sp. Satis latus, nitidus, nigro-subaeneus, elytris pro parte purpureo-metallicis, sutura viridescens, antennis pedibusque nigris aut pro parte nigro-piceis. Long. 18-19 mill. N^lle^ Guinée : Stephansort.

Cette espèce, en outre de sa coloration différente, se distingue de la précédente, entre autres caractères, par sa forme plus robuste, plus élargie vers les épaules et ensuite plus nettement atténuée à l'extrémité, par ses élytres à stries faibles et ponctuées de gros points.

Pseudamargymus nov. gen. (1). Corpus latera-

(1) Je possède, dans ma collection, sous le nom de **Pyanirygmus corinthius** Frm. (nom sans doute inédit), originaire de Bornéo, une espèce allongée, atténuée postérieurement, d'un noir bronzé avec les membres foncés, les pattes, assez courtes, à cuisses inermes et robustes, les yeux grands et assez éloignés, en partie cachés par le prothorax, qui est transversal, presque droit sur les côtés, et rebordé ; les antennes sont épaisses et dépassent peu le prothorax, avec le 3e article plus du double du 2e. Ce dernier caractère rapproche *Pyanirygmus* Frm. des genres *Pontianacus* Frm. et *Pyanisia* Cast. Par sa forme rappelle *Pubamarygmus* mihi, mais les antennes sont plus robustes et le corps est glabre.

liter compressus et valde convexus ; oculis magnis, satis approximatis ; sutura clypealis distincta ; antennis elongatis, articulo 3° elongato ; pedibus satis elongatis.

Ce genre se distingue, à première vue, de *Amarygmus* Dalm., par sa forme très convexe et plus ou moins comprimée latéralement.

Pseudamarygmus testaceipes n. sp. Nitidus, nigro-piceus, supra æneus, capite antice, antennis ad basin pedibusque testaceis. Long. 4,5 mill. Java : Sœkaboemi.

Cette espèce, qui est atténuée aux deux extrémités, a son prothorax moins fortement et plus éparsément ponctué que la tête, ses élytres présentent des traces de stries ponctuées de points forts avec les intervalles finement et éparsément ponctués.

Pseudamarygmus testaceitarsis n. sp. Nitidus, nigro-piceus, supra viridi-metallicus, antennis pedibusque nigro-piceis, tarsis testaceis. Long. 5 mill. Sumatra : Telaga Bodas.

Distinct du précédent, en outre de la coloration plus foncée des pattes et celle verdâtre du dessus, par le prothorax un peu moins court, les élytres à stries plus faibles et plus finement ponctués.

Pseudamarygmus Dohertyi n. sp. Nitidus, supra viridis et purpureo tinctus, infra, pedibus antennisque testaceis. Long. 4 mill. Malacca : Perak (Doherty).

En outre de la coloration différente, se distingue de *N. testaceipes* Pic, par les stries en partie effacées, ou très fines, des élytres.

Pseudamarygmus niasensis n. sp. Nitidus, antennis, his ad basin testaceis, pedibus et infra corpore nigro-piceis, supra viridis et purpureo tinctus. Long. 4 mill. Ile Nias.

Diffère du précédent par la coloration plus foncée des

pattes, la forme un peu plus allongée et les rangées de points plus forts des élytres.

Otoceromorphus nov. gen. Oculis distantibus ; articulis 5 et sequentibus antennarum latis et deplanatis ; thorace lateraliter mediocre tuberculato ; elytris lateraliter fortiter costatis.

Ce genre, qui semble voisin de *Otocerus* Makl., mais avec des yeux plus écartés et des antennes en partie comprimées, se distingue, en outre, nettement par la présence d'une côte très saillante partant de l'épaule et atteignant presque le sommet des élytres.

Otoceromorphus Gounellei n. sp. Elongatus, subparallelus, parum nitidus, viridi-æneus aut nigro-æneus, thorace pro parte rubro, femoribus aliquot ad basin plus minusve et costa lateraliter elytrorum plus minusve luteis (forma typica), aut costa ænea (**var. nov. costulatus**), aliquot elytris ad suturam longitudinaliter luteo lineatis (**var. nov. lineatus**). Long. 9-10 mill. Brésil et République Argentine.

Cette espèce variable a l'avant-corps densément et rugueusement ponctué, les élytres marqués de multiples rangées longitudinales de gros points avec une petite côte présuturale et deux faibles côtes discales parfois en partie effacées, en outre, d'une côte plus large ou plus saillante, latérale, de plus, la suture est élevée ; les pattes sont grêles et pas très longues, les antennes relativement courtes.

Falsostrongylium nov. gen. Oculis distantibus ; antennis elongatis, apice mediocre dilatatis ; thorace transverso, marginato, in disco fortiter biimpresso, lateraliter subangulato.

Faciés du genre précédent, bien distinct par ses antennes non comprimées et les élytres dépourvus de côte latérale, en outre, caractérisé par la particulière structure du prothorax.

Falsostrongylium semirufum n. sp. Subniti-

dus, niger, capite, thorace, scutello coxisque rufis, elytris striato-granulatis, intervallis pro parte costulatis. Long. 10 mill. Bolivie.

Cette espèce a la tête densément et ruguleusement ponctuée, le prothorax médiocrement ponctué et moins large que les élytres, distinctement rebordé sur son pourtour avec deux larges et profondes impressions discales, les élytres parallèles, courtement atténués à l'extrémité, largement striés avec les stries ornées de granules punctiformes, les intervalles étroits sont en partie costulés, au moins postérieurement.

Falsostrongylium subcostulatum n. sp. Nitidus, niger, capite antice, thorace lateraliter plus minusve, scutello coxisque rufis, elytris caerulescentibus, lineato punctatis, postice costulatis. Long. 10-11 mill. Pérou.

Diffère de l'espèce précédente, en outre de la coloration, par la sculpture élytrale différente, ces organes présentant antérieurement des rangées de points médiocres avec les intervalles larges et déprimés mais ceux-ci sont multicostulés à l'extrémité.

Cryptocephalus talianus n. sp. Robustus, nitidus, pallido-testaceus, oculis, mandibulis antennisque apice nigris.

Robuste, un peu atténué postérieurement, testacé-pâle avec les yeux, les mandibules et l'extrémité des antennes noirs. Tête sillonnée sur le front ; prothorax court, rétréci en avant, presque lisse, à marge postérieure foncée ; écusson triangulaire ; élytres de la largeur du prothorax, courts, atténués postérieurement, à rangées assez régulières de petits points ; pattes robustes. Long. 6 mill. Chine : Tali.

Ressemble à *Cr. sulphureus* Ol., d'Europe, mais de forme plus robuste avec les élytres moins fortement ponctués. A placer près de *C. nigrolimbatus* Jac.

Cryptocephalus sublineelus n. sp. Oblongus,

nitidus, testaceus, elytris lineis brunnescentibus ornatis.

Oblong, brillant, testacé avec les élytres ornés de lignes longitudinales moins claires, brunâtres. Yeux gris ; antennes longues, rembrunies à l'extrémité ; prothorax assez court, rétréci en avant, presque lisse, à marge postérieure foncée ; écusson triangulaire ; élytres de la largeur du prothorax, courts, atténués postérieurement, à rangées régulières de points assez gros ; pattes moyennes. Long. 4 mill. Chine : Yunnan.

Très distinct du précédent par la coloration moins pâle, la ponctuation plus forte et les linéoles des élytres.

Cryptocephalus subcyaneonotatus n. sp. Oblongus, postice attenuatus, nitidus, infra niger, supra testaceus et nigro-cyaneo maculatus, capite scutelloque nigris, femoribus pro parte nigris.

Cette espèce, qui est foncée avec le prothorax et les élytres maculés de noir bleuté, a les pattes testacées, les cuisses étant en partie noires, les élytres fortement ponctués en rangées, le prothorax fortement et éparsément ponctué, celui-ci orné d'une double macule discale foncée jointe intérieurement, les élytres, bordés de foncé à la base, sont ornés de deux petites macules antérieures, isolées dont une humérale, et d'une grosse macule suturale, commune en dessus du milieu, celles-ci noires et légèrement teintées de bleu. Long. 4 mill. Côte-d'Ivoire (acquis de Le Moult).

Peut se placer près de *Cr. oblitus* Er., coloration différente et prothorax maculé de foncé.

Diagnoses d'Hétéromères

Tetraonyx Le Moulti n. sp. Crassus, subopacus, niger, capite, thorace, scutello, femoribus ad basin et infra corpore antice piceis, dense luteo pubescentibus. Long. 18 mill. Guyane Française : Koura (Le Moult).

Voisin de *T. bicolor* Serv., mais bien distinct par son prothorax foncé et immaculé, ainsi que par la base des cuisses non testacée.

Tetraonyx argentinus n. sp. Satis elongatus, nitidus, antennis et infra corpore nigris, abdomine apice testaceo, supra testaceus, nigro maculatus, pedibus nigris, femoribus ad basin tibiisque ad medium testaceis. Long. 9-11 mill. République Argentine : Mendoza.

Très voisin de *T. 7-guttatus* Curtis, mais avant-corps plus fortement ponctué, prothorax moins arrondi sur les côtés et tibias en partie testacés.

Tetraonyx maculatus v. nov. innotatipennis. Rufescens, antennis, geniculis, tibiis tarsisque nigris. Vénézuéla :Caracas.

Très distinct de *T. maculatus* Cast., par les élytres non maculés de noir.

Pseudocistela rufomaculata n. sp. Subovatus, satis elongatus, nitidus, viridi-metallicus, elytris lateraliter et apice pallidioribus, ad humeros rufo maculatis, pedibus et infra corpore pro parte rufescentibus. Long. 5,5 mill. Kina-Balu.

Très voisin de *P. viridimetallica* Pic, mais avec les élytres maculés de roux.

Pseudocistela violacea n. sp. Subovatus, sat elongatus, nitidus, niger, femoribus ad basin rufescen-

tibus, thorace elytrisque violaceo-cœruleis. Long. 6 mill. Kina-Balu.

Diffère du précédent par les pattes en majeure partie foncées, la coloration uniforme et différente du dessus.

Pseudocistela Le Moulti n. sp. Oblongo-elongatus, subnitidus, antice densissime punctatus, niger, capite postice, thorace elytrisque viridescentibus. Long. 5,5 mill. Dahomey (acquis de Le Moult).

Voisin de *P. cæruleonitens* Pic. mais dessus moins brillant et ponctuation plus dense sur l'avant-corps.

Pseudocistela subparallela n. sp. Elongatus, subparallelus, parum nitidus, griseo-pubescens, rufus, elytris pro parte viridescentibus, antennis, capite postice tarsisque nigris. Long. 8 mill. Côte d'Ivoire : Dimbroko.

Espèce voisine de *C. capitata* Müll., mais de forme plus allongée.

Xystropus crassicornis n. sp. Parum nitidus, æneo-viridescens, antennis pedibusque cyaneis, femoribus ad basin late rufis ; antennis validis ; capite thoraceque densissime punctatis (punctis umbilicatis), illo breve, lateraliter arcuato ; elytris satis latis, lineato punctatis et nigro hirsutis. Long. 9 mill. Brésil : Minas.

Cette espèce, distincte par la coloration en partie rousse de ses pattes, peut prendre place près de *X. violaceus* Blanch.

Lystronychus minasensis n. sp. Elongatus, fere opacus, nigro-subæneus, elytris æneo-rufescentibus, antennis pedibusque cyaneis, femoribus ad basin late rufis ; antennis parum gracilibus ; capite thoraceque densissime ruguloso punctatis, illo lateraliter mediocre denticulato ; elytris parum latis, alutaceis, lineato punctatis et granulis pilosis ornatis. Long. 8 mill. Brésil : Minas.

Voisin de *L. denticollis* Makl., mais prothorax moins nettement denté, antennes entièrement foncées, etc.

Chlorophila cyanea n. sp. Elongatus, nitidus,

elytris subopacis, infra corpore viridi-metallicus, abdomine pro parte testaceo, supra cyaneus, antennis pedibusque testaceis, femoribus apice nigris, tarsis piceo annulatis. Long. 20 mill. Chine : Fokien (acquis de Donckier).

Cette grande et jolie espèce, très reconnaissable à sa coloration bleue, peut se placer près de *C. campestris* Fairm.

Nemostira semipicea n. sp. Modice elongatus, nitidus, testaceus, elytris nigro-piceis, pedibus nigris, femoribus ad basin testaceis ; capite lato, irregulariter punctato ; thorace breve, disperse punctato ; elytris satis latis, fortiter crenato-striatis, interstitiis convexis. Long. 8 mill. Dahomey.

Voisin de *N. rufa* Borch., mais coloration des élytres plus foncée.

Nemostira neoguineensis n. sp. Modice elongatus, nitidus, testaceus, elytris, abdomine, femoribus apice, capite postice antennisque apice nigro-piceis ; capite satis lato, subtile punctato ; thorace breve, minutissime punctato ; elytris satis latis, fortiter crenato-striatis, interstitiis convexis. Long. 8 mill. N^lle^ Guinée.

Ressemble au précédent, ponctuation de la tête plus faible, ponctuation des stries plus forte, pattes de coloration différente, etc.

Camarimena caerulea n. sp. Nitidus, elongatus, postice attenuatus, cœruleo-viridescens ; thorace elongato, irregulariter punctato ; elytris postice substriatis, antice longitudinaliter lineato impressis. Variat : colore, nigro-cupreo (**var. nov. Maindroni**). Indes.

Cette espèce peut se placer près de *C. Renardi* Frm., sa sculpture élytrale est différente.

Camarimena rufipennis n. sp. Nitidus, elongatus, postice attenuatus, rufus, capite thoraceque pro parte subaeneis, antennis apice nigris ; thorace elongato,

sat dense punctato ; elytris lineato punctatis. Long. 15 mill. Indes : Chambaganor.

Différe du précédent, en outre de la coloration, par la ponctuation des élytres moins profonde et plus régulière.

Camaria distincticollis n. sp. Nitidus, modice elongatus, aeneus ; capite thoraceque mediocre sat sparse punctatis, illo transverso, ad angulos anticos sinuato ; elytris satis latis, apice acuminatis, substriatis, striis subpurpureis, minute punctatis. Long. 27 mill. Indes orientales.

Voisin de *C. angulicollis* Frm., mais les angles postérieurs du prothorax sont arrondis et les antérieurs peu avancés.

Camaria lata n. sp. Fere opacus, latus, postice ampliatus, aurato-cupreus aut purpureus, capite thoraceque densissime punctatis, illo breve ; elytris latis, striatis, indistincte punctatis, intervallis convexis. Long. 25 mill. Chine : Fokien.

Forme et sculpture de *C. regia* Frm., mais prothorax un peu moins large, élytres relativement moins allongés et coloration différente.

Camaria niasensis n. sp. Nitidus parum elongatus, postice mediocre ampliatus, viridi-purpureus aut auratus, antennis plus minusve rufescentibus ; capite thoraceque mediocre et sparse punctatis ; elytris striatis et minute lineato punctatis, intervallis subconvexis. Long. 14-16 mill. Ile Nias.

A placer près de *C. malayana* Frm., ponctuation l'avant-corps différente, stries des élytres ayant une rangée de points fins peu marqués, etc.

Camaria geniculata n. sp. Nitidus elongatus, postice mediocre ampliatus et attenuatus, cupreus, antennis ad basin pedibusque rufescentibus, geniculis cyaneis ; capite thoraceque mediocre et parum dense punctatis ; scutello transverse sulcato ; elytris elongatis,

mediocre striatis et minute lineato punctatis, intervallis latis. Long. 32 mill. Kina-Balu.

Espèce des plus distinctes par sa forme jointe à la coloration des membres, le prothorax ayant ses angles antérieurs relevés et munis d'un bourrelet.

Camaria subparallela n. sp. Nitidus, elongatus, subparallelus, postice acuminatus, viridi-aeneus, antennis nigris, pedibus metallicis ; capite thoraceque minute, pro parte sparse, punctatis ; elytris striato-punctatis, intervallis subconvexis. Long. 18 mill. Kina-Balu.

Plus parallèle que le précédent, en diffère nettement par les angles antérieurs du prothorax arrondis, les élytres fortement striés, à intervalles plus étroits.

Camaria purpureolineata n. sp. Nitidus, modice elongatus, postice parum attenuatus, aeneus, antennis nigris, ad basin rufescentibus ; capite thoraceque mediocre, pro parte dense punctatis, illo transverso ; elytris mediocre striatis, striis purpureis, lineato punctatis, intervallis latis. Long. 28 mill. Java.

Plus large que le précédent avec les élytres à stries un peu pourprées, ornés de lignes de points bien marqués.

Camaria javana n. sp. Nitidus, modice elongatus, postice attenuatus, cupreus, elytris rufescentibus et viridi-metallicus tinctis, thorace transverso, medio sulcato, angulis posticis prominulis ; elytris mediocre punctato-striatis, intervallis satis latis. Long. 20 mill. Java.

Diffère du précédent par les élytres moins larges, de coloration moins foncée et le prothorax nettement sillonné.

Heterophyllus bimaculatus n. sp. Oblongo-ovatus, nitidus, niger, antennis ad basin capiteque antice rufescentibus, elytris ad humeros rufo maculatis ; capite alutaceo, mediocre et sparse punctato ; thorace transverso, sat fortiter et sparse punctato. Long. 3 mill. Madagascar : Annanarive.

Voisin de *H. similis* Chat., mais de coloration diffé-

rente, en majeure partie foncée et tête autrement ponctuée.

Heterophyllus Chatanayi (1) n. sp. Oblongus, nitidus, nigro-piceus, antennis ad basin pedibusque rufescentibus ; capite et labro sparse punctatis ; thorace sat breve, antice arcuato, minute et sparse punctato ; elytris irregulariter, sparse et sat fortiter punctatis ; tibiis anticis apice dilatatis. Long.. 3 mill. Madagascar.

Voisin de *H. minutissimus* Chat., s'en distingue par les tibias antérieurs nettement élargis au sommet, par le labre alutacé et la ponctuation.

Heterophilus curtus var. nov. bicoloriceps. Capite antice rufo, antennis apice vage brunnescentibus. Madagascar : Tananarive.

Megacantha laticollis n. sp. Satis elongatus, parum nitidus, niger ; thorace robusto, lato, lateraliter rotundato, minute punctato ; elytris striato-punctatis. Long. 24 mill. Cameroun.

Voisin de *M. dentata* F., prothorax plus robuste, dessus plus brillant, etc.

Megacantha brevipennis n. sp. Satis latus, nitidus, niger, thorace breve, parum convexo, minute punctato ; elytris satis brevibus, striato-punctatis. Long. 24 mill. Vieux Calabar.

Voisin du précédent, mais élytres proportionnellement plus larges par rapport au prothorax, dents des cuisses plus fines et plus droites, etc.

Megacantha brevispina n. p. Satis elongatus, nitidus, niger, thorace breve, lateraliter subsinuato, subdeplanato, elytris fortiter striato punctatis, femoribus anticis minute dentatis. Long. 20 mill. Angola.

De forme plus allongée que le précédent, prothorax

(1) Dédié à la mémoire de J. Chatanay, mort glorieusement au champ d'honneur.

moins arqué sur les côtés, dent des fémurs encore plus petite.

Megacantha dentata v. nov. Mocquerysi. Minutus, elongatus, nitidus, femoribus anticis breve spinosis. Long. 14 mill. Gabon (Mocquerys).

Megacantha dentata v. nov. gabonica. Brevis et satis latus, fere opacus, femoribus anticis mediocre spinosis. Long, 16-17 mill. Gabon.

Thecacerus curtipennis n. sp. Supra niger, infra subaeneus, nitidus, latus ; thorace breve, lateraliter sinuato, in disco biimpresso ; elytris brevibus, irregulariter punctatis, aut impressis, in disco bigibbosis, humeris satis prominulis. Long. 14 mill. Brésil : Theresopolis.

Diffère de *T. nodosus* Gray par les gibbosités moins élevées, les épaules moins pointues, la coloration, etc.

Thecacerus cupreus n. sp. Cupreus, nitidus, latus ; thorace breve, lateraliter sinuato, in disco minute biimpresso et sparse punctato ; elytris brevibus, irregulariter et longe punctatis, in disco bigibbosis, humeris sat prominulis ; tibiis anticis et intermediis dentatis. Long. 12 mill. Brésil : Minas Geraes.

Diffère du précédent, en outre de la coloration, par la ponctuation moins profonde et allongée des élytres, par les tibias dentés, etc.

Eulytus nodipennis v. nov. geniculatus. Pedibus rufis, geniculis plus minusve tarsisque nigris. Long. 15-17 mill. Afrique Orientale : Mont Ulcami.

Nesioticus flavopictus v. obliteratus. Elytris piceis, indistincte brunneo fasciatis. Long. 15 mill. Côte d'Ivoire.

Coriogeton borneense n. sp. Subovatus, satis latus, nitidus, niger, femoribus ad basin late rufis, thorace violaceo, elytris æneis, his minute lineato punctatis. Long. 14 mill. Bornéo : Brunei.

Voisin de *C. Donckieri* Pic, en diffère, en outre de la coloration, par la ponctuation élytrale plus distincte et les élytres plus nettement rétrécis à la base, vers les épaules.

Coriogeton borneense v. nov. niasense. Thorace subæneo, elytris cupreis, parum elongatis, femoribus ad basin mediocre rufis. Ile Nias.

Coriogeton minutum n. sp. Subovatus, satis latus, nitidus, nigro-piceus, supra æneo-viridescens, antennis pedibusque rufis, elytris sat fortiter lineato punctatis. Long. 10 mill. Java : Monts Tengger.

Espèce très distincte entre toutes par sa petite taille.

Coriogeton molossum (Fairm.). Subovatus, satis latus, nitidus, niger, supra æneus ; elytris thorace paulo latioribus, substriatis, lineato punctatis. Long. 17 mill. Ceylan.

Par sa forme voisin du précédent, mais, en outre de la grande taille, en diffère par les pattes plus foncées et les élytres moins larges par rapport au prothorax.

Amarygmus formosanus n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, convexus, niger, elytris ad basin et post medium luteo fasciatis, fasciis sinuatis et dentatis ; elytris mediocre striatis. Long. 7 mill. Formose : Fainan.

Espèce des plus distinctes par ses élytres ornés de deux fascies ondulés et jaunâtres.

Amarygmus undulatus n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, convexus, niger, elytris ad basin et post medium luteo fasciatis, fasciis sinuatis, secunda postice prolongata ; elytris substriatis et lineato punctatis. Long. 10 mill. Java (Rouyer).

Diffère du précédent par la ponctuation striale espacée et la bande postérieure des élytres prolongée à ses extrémités inférieures, plus longuement sur les côtés qu'en dedans.

Amarygmus luteonotatus n. sp. Oblongus, nitidus, convexus, niger, thorace antice rufo maculato, elytris nigro-subæneis, luteo notatis, ad basin et post medium sinuato-fasciatis, ante apicem breve maculatis ; elytris substriatis, lineato punctatis. Long. 9 mill. Java.

De forme moins allongée que le précédent avec les dessins élytraux différents et le prothorax orné, en avant, d'un demi-cercle roux.

Amarygmus rufonotatus n. sp. Oblongo-ovatus, nitidus, convexus, rufescens; antennis apice, thorace postice tibiisque pro parte nigris, elytris subaeneis, ad basin et apice rufo notatis, his fortiter striatis, Long. 6 mill. Bornéo : Brunei.

Voisin de *A. sanguineus* Frm., mais élytres autrement maculés et prothorax bicolore.

Amarygmus trimaculatus n. sp. Oblongo-ovatus, nitidus, convexus, rufescens, antennis apice, thorace postice late, pectore tibiisque pro parte nigris, elytris nigris, rufo trimaculatis (macula ad basin sinuata, macula medio transversa, macula postica elongata), his fortiter striatis. Long. 7 mill. Bornéo.

Diffère du précédent par les élytres noirs et marqués chacun de 3 macules rousses.

Amarygmus nigrofasciatus n. sp. Oblongo-ovatus, nitidus, convexus, rufescens, articulis 6-10 antennarum, thorace postice scutelloque nigris, elytris rufis, nigro-trifasciatis, macula prima et secunda lateraliter junctis, tertia ante apicem sita. Long. 6 mill. Malacca : Perak (Doherty).

Très voisin du précédent, mais dessins des élytres différents.

Amarygmus nigromaculatus n. sp. Elongato-ovatus, nitidus, convexus, rufus, articulis 6-10 antennarum, thorace in disco postice nigris, elytris quinque nigro maculatis, his fortiter striatis. Long. 6 mill. Zanguebar.

Très voisin du précédent, mais élytres maculés, et non fasciés, de noir. Les 5 macules sont ainsi disposécs : 3 jointes sur la suture, 2 latérales isolées sur chaque élytre.

Amarygmus binotatus n sp. Oblongo elongatus, nitidus, convexus, niger, thorace antice femoribusque ad medium rufis, elytris nigro-subaenis, in disco ad basin breve posticeque longe rufo maculatis, his substriatis et lineato punctatis. Long. 9 mill. Perak (Doherty).

De forme plus allongée que les précédents et en différant, en outre, par les élytres finement striés et à rangées de points.

Dietysus batjanensis n. sp. Oblongo-ovatus, convexus, nitidus, niger, thorace elytrisque æneis, labro, antennis ad basin, femoribus late tarsisque rufis ; elytris antice posticeque attenuatis, satis fortiter striato-punctatis. Long. 8 mill. Batjan.

Voisin de *D. longicrus* Frm. et distinct, à première vue, par la coloration des membres.

Dietysus testaceicornis. Oblongo-ovatus, convexus, nitidus, niger, supra parum metallicus, labro, palpis, antennis pedibusque (tibiis pro parte brunneis) rufo-testaceis ; elytris punctato lineatis. Long. 9 mill. Batjan.

Diffère du précédent, par les genoux roux, les antennes testacées, etc.

Pyanisia vestita v. nov. multimaculata. Fere opacus, capite 4 elytrisque multi nigro maculatis. Brésil.

Le prothorax, en plus des trois macules discales ordinaires, en a une quatrième devant l'écusson.

Pyanisia undata v. nov. bilineata. Parum nitidus, thorace nigro, lateraliter rufo-lineato. Colombie.

Variété caractérisée par la coloration du prothorax en majeure partie noire ; en outre, il n'y a pas de tache rousse incluse dans le noir apical des élytres.

Amarygmus 4-maculatus n. sp. Oblongo-ovatus, nitidus, subconvexus, infra rufescens, supra viridi-metallicus, elytris ad basin et ante apicem late rufo maculatis, his lineato punctatis, pedibus pro parte nigropiceis, pro parte rufescentibus, tibiis posticis apice curvatis et dilatatis, antennis nigris, ad basin rufescentibus. Long. 6 mill. Kina-Balu.

Espèce des plus distinctes, entre toutes, par son système de coloration.

Amarygmus niasensis n. sp. Subovatus, postice attenuatus, convexus, nitidus, niger, capite thoraceque viridi-metallicis, elytris purpureis, ad suturam viridis, his subtriatis, lineato punctatis. Long. 8 mill. Nias.

Cette jolie petite espèce peut prendre place près de *A. irideus* Frm., dont la coloration est un peu différente.

Amarygmus bruneiensis n. sp. Oblongo-ovatus, convexus, nitidus, niger, supra viridi-metallicus, thorace postice elytrisque in disco et ad medium purpureo tinctis ; elytris sat fortiter striatis. Long. 5-6 mill. Bornéo : Brunei.

Diffère du précédent, par la forme plus allongée, les élytres plus fortement striés, la coloration pourprée, du milieu des élytres, peu étendue.

Amarygmus cyaneus n. sp. Oblongo-ovatus, convexus, nitidus, niger, supra cyaneus, thorace alutaceo, mediocre punctato, elytris fortiter striatis. Long. 8 mill. Nouvelle Guinée.

Forme du précédent, mais coloration du dessus uniforme et élytres plus fortement striés.

TABLE

POUR LE SEIZIÈME FASCICULE

Pages.

Introduction 1

Genres nouveaux, espèces et variétés nouvelles. 2

Diagnoses d'Hétéromères. 14